

**ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ**  
**ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ**  
**2018**  
**ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ**

**ΘΕΜΑ Α**

**A1.** Να αποδείξετε ότι, αν μια συνάρτηση  $f$  είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο  $x_0$ , τότε είναι και συνεχής στο σημείο αυτό.

**Μονάδες 7**

**A2.** Θεωρήστε τον παρακάτω ισχυρισμό:

«Κάθε συνάρτηση  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  που είναι “1-1” είναι και γνησίως μονότονη.»

**α.** Να χαρακτηρίσετε τον παραπάνω ισχυρισμό, γράφοντας στο τετράδιό σας το γράμμα Α, αν είναι αληθής, ή το γράμμα Ψ, αν είναι ψευδής. (μονάδα 1)

**β.** Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας στο ερώτημα **α.** (μονάδες 3)

**Μονάδες 4**

**A3.** Να διατυπώσετε το Θεμελιώδες Θεώρημα του Ολοκληρωτικού Λογισμού.

**Μονάδες 4**

**A4.** Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

**α)** Η συνάρτηση  $f(x) = \eta\mu x$  με  $x \in \mathbb{R}$  έχει μία μόνο θέση ολικού μεγίστου.

**β)** Για κάθε παραγωγίσιμη συνάρτηση  $f$  σε ένα διάστημα  $\Delta$ , η οποία είναι γνησίως αύξουσα, ισχύει  $f'(x) > 0$  για κάθε  $x \in \Delta$ .

**γ)** Ισχύει  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sigma\upsilon\eta x}{x} = 0$ .

**δ)** Αν η  $f$  είναι αντιστρέψιμη συνάρτηση, τότε οι γραφικές παραστάσεις  $C$  και  $C'$  των συναρτήσεων  $f$  και  $f^{-1}$  αντίστοιχα είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία  $y = x$ .

**ε)** Κάθε κατακόρυφη ευθεία έχει το πολύ ένα κοινό σημείο με τη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης  $f$ .

**Μονάδες 10**

**ΘΕΜΑ Β**

Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = x - \frac{4}{x^2}$ ,  $x \in \mathbb{R} - \{0\}$ .

**B1.** Να μελετήσετε τη συνάρτηση  $f$  ως προς τη μονοτονία και τα τοπικά ακρότατα.

**Μονάδες 8**

**B2.** Να μελετήσετε τη συνάρτηση  $f$  ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής.

**Μονάδες 4**

**B3.** Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της συνάρτησης  $f$ .

**Μονάδες 6**

**B4.** Με βάση τις απαντήσεις σας στα παραπάνω ερωτήματα, να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης  $f$ .

(Η γραφική παράσταση να σχεδιαστεί με στυλό με μελάνι που δε σβήνει.)

**Μονάδες 7**

### **ΘΕΜΑ Γ**

Έχουμε ένα σύρμα μήκους 8 m, το οποίο κόβουμε σε δύο τμήματα. Με το ένα από αυτά, μήκους  $x$  m, κατασκευάζουμε τετράγωνο και με το άλλο κύκλο.

**Γ1.** Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των εμβαδών των δύο σχημάτων σε τετραγωνικά μέτρα, συναρτήσει του  $x$ , είναι

$$E(x) = \frac{(\pi + 4)x^2 - 64x + 256}{16\pi}, \quad x \in (0, 8).$$

**Μονάδες 5**

**Γ2.** Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των εμβαδών των δύο σχημάτων ελαχιστοποιείται, όταν η πλευρά του τετραγώνου ισούται με τη διάμετρο του κύκλου.

**Μονάδες 10**

**Γ3.** Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένας μόνο τρόπος με τον οποίο μπορεί να κοπεί το σύρμα μήκους 8 m, ώστε το άθροισμα των εμβαδών των δύο σχημάτων να ισούται με  $5 \text{ m}^2$ .

**Μονάδες 10**

### **ΘΕΜΑ Δ**

Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = 2e^{x-\alpha} - x^2$ ,  $x \in \mathbb{R}$  με  $\alpha > 1$ .

**Δ1.** Να αποδείξετε ότι για κάθε τιμή του  $\alpha > 1$  η γραφική παράσταση της συνάρτησης  $f$  έχει ακριβώς ένα σημείο καμπής.

**Μονάδες 3**

**Δ2.** Να αποδείξετε ότι υπάρχουν μοναδικά  $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$  με  $x_1 < x_2$ , τέτοια ώστε η συνάρτηση  $f$  να παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο  $x_1$  και τοπικό ελάχιστο στο  $x_2$ .

**Μονάδες 7**

**Δ3.** Να αποδείξετε ότι η εξίσωση  $f(x) = f(1)$  είναι αδύνατη στο  $(\alpha, x_2)$ .

**Μονάδες 6**

**Δ4.** Αν  $\alpha = 2$  να αποδείξετε ότι :

$$\int_2^3 f(x)\sqrt{x-2} \, dx > -\frac{32}{15}.$$

**Μονάδες 9**

## ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

### ΘΕΜΑ Α

**A1.** Θεωρία, σελ. 99 σχολικού βιβλίου.

**A2. α.** Λάθος.

**β.** Διότι για παράδειγμα η συνάρτηση  $f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0 \\ \frac{1}{x}, & x > 0 \end{cases}$  είναι 1-1, αλλά όχι γνησίως μονότονη.

**A3.** Θεωρία, σελ. 216 σχολικού βιβλίου.

**A4. α.** Λάθος, **β.** Λάθος, **γ.** Σωστό, **δ.** Σωστό, **ε.** Σωστό

### ΘΕΜΑ Β

**B1.** Για κάθε  $x \in \mathbb{R} - \{0\}$ , είναι:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left( x - \frac{4}{x^2} \right)' = (x)' - 4 \left( \frac{1}{x^2} \right)' = 1 - 4 \left( \frac{-2x}{x^4} \right) = \\ &= 1 + \frac{8}{x^3} = \frac{x^3 + 2^3}{x^3} = \frac{(x+2) \cdot (x^2 - 2x + 4)}{x^3} \end{aligned}$$

$$\text{Είναι } x^2 - 2x + 4 = (x^2 - 2x + 1) + 3 = (x-1)^2 + 3 > 0$$

$$\text{Άρα } f'(x) = 0 \Leftrightarrow x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = -2$$

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow \frac{x+2}{x^3} > 0 \Leftrightarrow (x+2) \cdot x^3 > 0$$

$$f'(x) < 0 \Leftrightarrow \frac{x+2}{x^3} < 0 \Leftrightarrow (x+2) \cdot x^3 < 0$$

Προκύπτει ο επόμενος πίνακας μεταβολών:

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$
x+2	-	⊖	+	+
x <sup>3</sup>	-		-	⊖
f'	+	⊖	-	+
f	↗ τ.μ. ↘			↗

Επομένως η  $f$ :

- Είναι γνησίως αύξουσα σε καθένα από τα διαστήματα  $(-\infty, -2]$  και  $(0, +\infty)$ .
- Είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα  $[-2, 0)$ .
- Έχει τοπικό μέγιστο στη θέση  $x_0 = -2$ , την τιμή  $f(-2) = -2 - \frac{4}{4} = -3$ .

**B2.** Για κάθε  $x \in \mathbb{R} - \{0\}$  είναι:

$$\begin{aligned} f''(x) &= (f'(x))' = \left(1 + \frac{8}{x^3}\right)' = 8\left(\frac{1}{x^3}\right)' = 8 \frac{-3x^2}{x^6} = \\ &= -\frac{24}{x^4} < 0 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R} - \{0\}. \end{aligned}$$

Άρα η  $f$  στρέφει τα κοίλα κάτω σε καθένα από τα διαστήματα  $(-\infty, 0)$  και  $(0, +\infty)$ , ενώ δεν παρουσιάζει σημείο καμπής.

**B3**

**α)** Κατακόρυφες ασύμπτωτες:

$\lim_{x \rightarrow -0} x = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow -0} \left(\frac{-4}{x^2}\right) = -\infty$ , άρα  $\lim_{x \rightarrow -0} f(x) = -\infty$ . Άρα η  $f$  έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη την ευθεία  $x = 0$  (κατακόρυφος άξονας), στο  $-\infty$ .

**β)** Οριζόντιες ασύμπτωτες

**β1)**  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\frac{4}{x^2}\right) = 0$ .

Άρα  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$  και η  $f$  δεν έχει οριζόντια ασύμπτωτη στο  $-\infty$ .

**β2)**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{4}{x^2}\right) = 0$ .

Άρα  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$  και η  $f$  δεν έχει οριζόντια ασύμπτωτη στο  $+\infty$ .

**γ)** Πλάγιες ασύμπτωτες:

Είναι  $\frac{f(x)}{x} = 1 - \frac{4}{x^3} = \frac{x^3 - 4}{x^3}$ .


Άρα  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$  και  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$ . ( $= \alpha$ )

Επίσης  $f(x) - x = \frac{-4}{x^3}$ , άρα

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = 0$  και  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - x) = 0$  ( $= \beta$ )

Άρα η  $f$  έχει πλάγια ασύμπτωτη την ευθεία  $y = x$  και στο  $+\infty$  και στο  $-\infty$ .

B4



$$f(x) = 0 \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{4}.$$

Επομένως η γραφική παράσταση της  $f$  τέμνει τον οριζόντιο άξονα στο σημείο  $A(\sqrt[3]{4}, 0)$ .

### ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Το πρώτο τμήμα αφού είναι μήκους  $x$  και κατασκευάζουμε τετράγωνο. Η πλευρά του τετραγώνου θα είναι  $\frac{x}{4}$ , επομένως το εμβαδόν του τετραγώνου θα είναι

$$E_1 = \left(\frac{x}{4}\right)^2 = \frac{x^2}{16}.$$

Το δεύτερο τμήμα θα είναι μήκους  $8 - x$ . Αν  $\rho$  η ακτίνα του κύκλου που κατασκευάζεται με το τμήμα αυτό, τότε θα είναι  $2\pi\rho = 8 - x \Leftrightarrow \rho = \frac{8 - x}{2\pi}$ .

Άρα το εμβαδόν του κύκλου θα είναι

$$E_2 = \pi\rho^2 = \pi\left(\frac{8 - x}{2\pi}\right)^2 = \pi\frac{(8 - x)^2}{4\pi^2} = \frac{(8 - x)^2}{4\pi} = \frac{64 + x^2 - 16x}{4\pi}.$$

Επομένως το άθροισμα των εμβαδών θα είναι

$$\begin{aligned} E(x) &= E_1 + E_2 = \frac{x^2}{16} + \frac{64 + x^2 - 16x}{4\pi} = \\ &= \frac{\pi x^2 + 256 + 4x^2 - 64x}{16\pi} = \frac{(\pi + 4)x^2 - 64x + 256}{16\pi} \end{aligned}$$

$$\text{Είναι } x > 0 \text{ και } 8 - x > 0 \Leftrightarrow \begin{matrix} x > 0 \\ x < 8 \end{matrix} \Leftrightarrow 0 < x < 8.$$

**Γ2.** Είναι  $E'(x) = \frac{1}{16\pi} [2(\pi + 4)x - 64]$ ,  $0 < x < 8$ .

$$\text{Είναι } E'(x) \geq 0 \Leftrightarrow 2(\pi + 4)x - 64 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq \frac{32}{\pi + 4}.$$

Άρα από τον πίνακα μεταβολών η  $E$  παρουσιάζει ελάχιστο στο  $x = \frac{32}{\pi + 4}$

$$\text{με τιμή } E = \left( \frac{32}{\pi + 4} \right) = \frac{(\pi + 4) \frac{32^2}{(\pi + 4)^2} - 64 \cdot \frac{32}{\pi + 4} + 256}{16\pi} = \dots = \frac{16}{\pi + 4}$$

$x$	$0$	$\frac{32}{\pi + 4}$	$8$
$E'$		$-$	$+$
$E$		$\swarrow$	$\searrow$

Τότε η πλευρά του τετραγώνου είναι  $\frac{x}{4} = \frac{\frac{32}{\pi + 4}}{4} = \frac{8}{\pi + 4}$

και η διάμετρος του κύκλου είναι

$$2\rho = 2 \cdot \frac{8-x}{2\pi} = \frac{8-x}{\pi} = \frac{8 - \frac{32}{\pi + 4}}{\pi} = \frac{8\pi}{\pi(\pi + 4)} = \frac{8}{\pi + 4}.$$

Άρα το άθροισμα των εμβαδών των δύο σχημάτων ελαχιστοποιείται, όταν η πλευρά του τετραγώνου ισούται με τη διάμετρο του κύκλου.

**Γ3.** Αρκεί ν. δ. ο. η εξίσωση  $E(x) = 5$  έχει μοναδική λύση στο  $(0, 8)$ .

Για το διάστημα  $A_1 = \left( 0, \frac{32}{\pi + 4} \right]$ :

$$A_1 = \left( 0, \frac{32}{\pi + 4} \right] \xrightarrow[\text{Ε γνησίως φθίνουσα}]{\text{Ε συνεχής}} E(A_1) = \left[ E\left( \frac{32}{\pi + 4} \right), \lim_{x \rightarrow 0^+} E(x) \right] = \left[ \frac{16}{\pi + 4}, \frac{16}{\pi} \right)$$

$$\text{διότι } \lim_{x \rightarrow 0^+} E(x) = \frac{16}{\pi} \cdot \frac{16}{\pi + 4} \approx 2,24 \text{ και } \frac{16}{\pi} \approx 5,09.$$

Άρα  $5 \in E(A_1)$  και άρα από Θεώρημα Ενδιαμέσων Τιμών υπάρχει  $x_0 \in A_1 : E(x_0) = 5$  και επειδή η  $E$  είναι  $\downarrow$  στο  $A_1$ , άρα το  $x_0$  είναι μοναδικό, στο διάστημα  $A_1$ .

Επίσης για το διάστημα  $A_2 = \left[ \frac{32}{\pi + 4}, 8 \right)$ :

$$A_2 = \left[ \frac{32}{\pi+4}, 8 \right) \xrightarrow[E \text{ γνησίως αύξουσα}]{E \text{ συνεχής}} E(A_2) = \left[ E\left(\frac{32}{\pi+4}\right), \lim_{x \rightarrow 8^-} E(x) \right) = \left[ \frac{16}{\pi+4}, 4 \right) \text{ διότι}$$

$$\lim_{x \rightarrow 8^-} E(x) = \lim_{x \rightarrow 8^-} \frac{(\pi+4)x^2 - 64x + 256}{16\pi} = \frac{(\pi+4)8^2 - 64 \cdot 8 + 256}{16\pi} = 4$$

$5 \notin E(A_2)$  άρα η εξίσωση  $E(x) = 5$  είναι αδύνατη στο  $A_2$ .

Επομένως υπάρχει μοναδική τιμή  $x_0 \in \left(0, \frac{32}{\pi+4}\right) : E(x_0) = 5$ .

### ΘΕΜΑ Δ

**Δ1.**  $f(x) = 2x^{x-a} - x^2, \quad x \in \mathbb{R} \quad \text{με } \alpha > 1.$

Είναι  $f'(x) = 2 \cdot e^{x-a} - 2x^2, \quad x \in \mathbb{R}.$

$$f''(x) = (2 \cdot e^{x-a} - 2x)^{\prime} = 2 \cdot e^{x-a} - 2 = 2(e^{x-a} - 1), \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow e^{x-a} - 1 = 0 \Leftrightarrow e^{x-a} = 1 \Leftrightarrow e^{x-a} = e^0 \Leftrightarrow x-a = 0 \Leftrightarrow x = a$$

$$f''(x) > 0 \Leftrightarrow e^{x-a} - 1 > 0 \Leftrightarrow e^{x-a} > 1 \Leftrightarrow e^{x-a} > e^0 \Leftrightarrow x-a > 0 \Leftrightarrow x > a$$

$$f''(x) < 0 \Leftrightarrow e^{x-a} - 1 < 0 \Leftrightarrow e^{x-a} < 1 \Leftrightarrow e^{x-a} < e^0 \Leftrightarrow x-a < 0 \Leftrightarrow x < a$$

Συγκεντρωτικό:

<b>x</b>	$-\infty$	$\alpha$	$+\infty$
<b>f'(x)</b>	-	⊖	+
<b>f</b>	↪	Σ.Κ.	↪

Άρα η  $f$  παρουσιάζει σημείο καμπής στη θέση  $x_0 = a$ .

**Δ2** **α)**  $f'(x) = 2(e^{x-a} - x), \quad x \in \mathbb{R}$

βρίσκουμε το όριο της  $f'$  στο  $x \rightarrow -\infty$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{x-a} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left( \frac{1}{e^a} \cdot e^x \right) = \frac{1}{e^a} \cdot 0 = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x) = +\infty. \text{ Άρα } \lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = +\infty$$

**β)**  $f'(a) = 2(e^{a-a} - a) = 2(1-a) < 0.$

**γ)** Βρίσκουμε το όριο της  $f'$  όταν  $x \rightarrow +\infty$

$$\text{Είναι } f'(x) = \frac{2}{e^a} \cdot e^x - 2x = x \cdot \left( \frac{2}{e^a} \cdot \frac{e^x}{x} - 2 \right).$$

Επειδή  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(e^x)'}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$

Άρα  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{2}{e^a} \cdot \frac{e^x}{x} - 2 \right) = +\infty$

Επίσης  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ , άρα  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$ .

Η  $f'$  είναι συνεχής στο  $\mathbb{R}$  και γνησίως φθίνουσα στο διάστημα  $(-\infty, a]$  (λόγω του B1)

Άρα  $f'((-\infty, a]) = [f'(a), \lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x)] = [2 \cdot (1-a), +\infty)$ .

Η  $f'$  είναι συνεχής στο  $\mathbb{R}$  και γνησίως αύξουσα στο διάστημα  $[a, +\infty)$  (λόγω του Δ1)

Άρα  $f'([a, +\infty)) = [f'(a), \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)] = [2 \cdot (1-a), +\infty)$ , με  $2(1-a) < 0$ .

Άρα υπάρχει τιμή  $x_1$  στο διάστημα  $(-\infty, a]$  ώστε  $f'(x_1) = 0$  και τιμή  $x_2$  στο διάστημα  $[a, +\infty)$ , ώστε  $f'(x_2) = 0$ .

Όμως στο  $(-\infty, a]$  η  $f'$  είναι γνησίως φθίνουσα

άρα  $x < x_1 \Rightarrow f'(x) > f'(x_1) \Rightarrow f'(x) > 0$

για  $x > x_1 \Rightarrow f'(x) < f'(x_1) \Rightarrow f'(x) < 0$

Επίσης στο  $[a, +\infty)$  η  $f'$  είναι γνησίως αύξουσα

άρα  $x < x_2 \Rightarrow f'(x) < f'(x_2) \Rightarrow f'(x) < 0$

για  $x > x_2 \Rightarrow f'(x) > f'(x_2) \Rightarrow f'(x) > 0$

Δηλαδή προκύπτει ο επόμενος πίνακας μεταβολών της  $f'$

X	$-\infty$	$x_1$	$a$	$x_2$	$+\infty$
$f'$	$+\infty$	$+$	$\ominus$	$\ominus$	$+$
$f$	$\nearrow$	τ.μ.	$\searrow$	τ.ε.	$\nearrow$

Προκύπτει ότι υπάρχουν μοναδικά  $x_1, x_2$  τέτοια ώστε η  $f$  παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο  $x_1$  και τοπικό ελάχιστο στο  $x_2$ .

**Δ3.** Αφού  $a > 1$  και  $f'$  γνησίως φθίνουσα στο  $(-\infty, a]$  ισχύει:  
 $a > 1 \Rightarrow f'(a) < f'(1) \Rightarrow 2 - 2a < 2 \cdot e^{1-a} - 2 \Rightarrow e^{1-a} > 2 - a$  (1).

Στο διάστημα  $(a, x_2)$  η  $f$  είναι γνησίως φθίνουσα άρα το

$f((a, x_2)) = \left( \lim_{x \rightarrow x_2^-} f(x), \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \right) = \left( \lim_{x \rightarrow x_2} f(x), 2 - a^2 \right)$ , δηλαδή

$f(x) < 2 - a^2 = f(a)$  (2)

Είναι  $f(1) = 2 \cdot e^{1-a} - 1$

Όμως λόγω της (1)

$$e^{1-a} > 2 - a \Rightarrow 2e^{1-a} > 2(2 - a) \Rightarrow 2 \cdot e^{1-a} - 1 > 4 - 2a - 1 \Rightarrow f(1) > 3 - 2a.$$

Όμως  $3 - 2a > 2 - a^2 \Leftrightarrow a^2 - 2a + 1 > 0 \Leftrightarrow (a - 1)^2 > 0$ , που ισχύει.

Άρα  $f(1) > f(a)$  (3)

Από (2) και (3) έπεται:

$f(x) < f(a) < f(1)$ , άρα η  $f(x) = f(1)$  είναι αδύνατη.

(β' τρόπος)

Επειδή  $a > 1$  είναι  $1 - a < 0$  και  $e^{1-a} < e^0 \Leftrightarrow e^{1-a} < 1 \Leftrightarrow e^{1-a} - 1 < 0$ .

Όμως  $f'(1) = 2(e^{1-a} - 1)$ , άρα  $f'(1) < 0$ .

Αν  $1 \leq x_1$  επειδή η  $f'$  είναι γνησίως φθίνουσα στο  $(-\infty, a]$  άρα και στο  $(-\infty, x_1] \subseteq (-\infty, a]$  είναι  $f'(1) \geq f'(x_1) \Leftrightarrow f'(1) \geq 0$  άτοπο

Άρα  $1 > x_1$  ή  $a > 1 > x_1$ .

Στο διάστημα  $[a, x_2] \subseteq [x_1, x_2]$  η  $f$  είναι γνησίως φθίνουσα. Άρα επειδή  $a > 1 \Rightarrow f(a) < f(1)$  (1)

Επίσης είναι  $f((a, x_2)) = (f(x_2), f(a))$ .

Άρα για κάθε  $x \in (a, x_2)$  είναι  $f(x) < f(a) < f(1)$  (λόγω της 1).

Άρα η  $f(x) = f(1)$  είναι αδύνατη.

(γ' τρόπος)

$f(x)$  γνησίως φθίνουσα στο  $[a, x_2]$  άρα

$$f[a, x_2] = [f(x_2), f(a)]$$

Όμως  $f(1) = 2 \cdot e^{1-a} - 1$  και  $f(a) = 2 - a^2$ .

Θα δείξουμε ότι:  $f(1) > f(a) \Leftrightarrow 2 \cdot e^{1-a} - 1 > 2 - a^2 \Leftrightarrow 2 \cdot e^{1-a} + a^2 - 3 > 0$ ,  
με  $a > 1$ .

Έστω  $K(x) = 2 \cdot e^{1-x} + x^2 - 3$ ,  $x \in \mathbb{R}$ . Αρκεί να δείξουμε ότι  $K(x) > 0$  για κάθε  $x > 1$ .

Η  $K(x)$  παραγωγίσιμη ως αποτέλεσμα πράξεων παραγωγισίμων με:

$$K'(x) = -2 \cdot e^{1-x} + 2 \cdot x$$

Η  $K'(x)$  παραγωγίσιμη ως αποτέλεσμα πράξεων παραγωγισίμων με:

$$K''(x) = 2 \cdot e^{1-x} + 2 > 0 \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}.$$

Άρα  $K'(x)$  γνησίως αύξουσα και ισχύει  $K'(1) = 0$ .

Για  $x < 1$   $\overset{K'(x) \text{ γνησίως αύξουσα}}{\Rightarrow} K'(x) < K'(1) = 0$  άρα  $K(x)$  είναι γνησίως φθίνουσα

Για  $x > 1$   $\overset{K'(x) \text{ γνησίως αύξουσα}}{\Rightarrow} K'(x) > K'(1) = 0$  άρα  $K(x)$  είναι γνησίως αύξουσα

$x$	$-\infty$	$1$	$+\infty$
$K'(x)$	$-$	$\ominus$	$+$
$K(x)$			

τοπ.  
ελάχιστο

Η  $K(x)$  έχει ελάχιστο το  $K(1) = 0$ , και  $K(x) > K(1) = 0$  για κάθε  $x > 1$ .

**Δ4** Για  $a = 2$ , είναι  $f(x) = 2 \cdot e^{x-2} - x^2$ .

Η εφαπτομένη της  $f$  στο σημείο με τετμημένη  $x_0 = 2$  είναι η ευθεία:

$$y - f(2) = f'(2) \cdot (x - 2) \Leftrightarrow y - (-2) = -2(x - 2) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow y + 2 = -2x + 4 \Leftrightarrow y = -2x + 2 \Leftrightarrow y = -2(x - 1)$$

Επειδή η  $f$  στρέφει τα κοίλα άνω στο διάστημα  $[a, +\infty) = [2, +\infty)$ , προκύπτει ότι για  $x \in [2, 3]$ :

$$f(x) \geq -2(x - 1) \Leftrightarrow f(x) \cdot \sqrt{x - 2} \geq -2(x - 1)\sqrt{x - 2} \Leftrightarrow$$

$$f(x) \cdot \sqrt{x - 2} - (-2(x - 1)\sqrt{x - 2}) \geq 0.$$

με την ισότητα να ισχύει μόνον για  $x = 2$ .

Άρα

$$\int_2^3 f(x) \cdot \sqrt{x - 2} - (-2(x - 1)\sqrt{x - 2}) dx > 0 \Leftrightarrow$$

$$\int_2^3 f(x) \sqrt{x - 2} dx > \int_2^3 [-2(x - 1)\sqrt{x - 2}] dx \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \int_2^3 f(x) \sqrt{x - 2} dx > -2 \int_2^3 (x - 2 + 1)\sqrt{x - 2} dx. \quad (1)$$

Για το ολοκλήρωμα του 2<sup>ου</sup> μέλους θέτουμε  $u = x - 2$ , οπότε αυτό γράφεται:

$$\int_2^3 (x - 2 + 1)\sqrt{x - 2} dx = \int_0^1 (u + 1)\sqrt{u} du.$$

Έτσι η (1) γράφεται

$$\int_2^3 f(x) \sqrt{x - 2} dx > -2 \int_0^1 (u + 1)\sqrt{u} du$$

$$\Leftrightarrow \int_2^3 f(x) \sqrt{x - 2} dx > -2 \int_0^1 (u^{3/2} + u^{1/2}) du,$$

$$\int_2^3 f(x)\sqrt{x-2} \, dx > -2 \left[ \frac{2}{5} u^{5/2} \right]_0^1 - 2 \left[ \frac{2}{3} u^{3/2} \right]_0^1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \int_2^3 f(x)\sqrt{x-2} \, dx > -2 \left( \frac{2}{5} \right) - 2 \left( \frac{2}{3} \right) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \int_2^3 f(x)\sqrt{x-2} \, dx > -\frac{4}{5} - \frac{4}{3} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \int_2^3 f(x)\sqrt{x-2} \, dx > -\frac{32}{15}$$

